


Qu'est-ce que l'algie vasculaire de la face ?

L'algie vasculaire de la face (AVF), aussi appelée céphalée de Horton ou « céphalée du suicide », est souvent décrite comme la pire douleur qu'un être humain puisse ressentir. Elle est différente de la migraine et nécessite un traitement différent.



👁 Douleur extrême d'un seul côté, derrière l'œil

Perçante, souvent comparée à un fer rouge enfoncé dans l'œil.

🕒 Des crises de 15 minutes à 3 heures

Souvent plusieurs fois par jour (à des heures similaires), pendant des semaines ou des mois (cycles).

💧 Œil rouge ou larmoyant, nez qui coule ou bouché

Généralement du côté douloureux uniquement.

🌀 Agitation

Faire les cent pas ou se balancer, impossible de rester immobile.



Pas une migraine

	AVF	MIGRAINE
Durée	15 min à 3 heures	4 à 72 heures
Fréquence	Presque tous les jours, souvent plusieurs fois par jour, pendant des semaines ou des mois	Quelques-unes par mois
Pendant une crise	Agitation, va-et-vient	Allongé immobile dans une pièce sombre

🕒 Comment traiter l'AVF



Les antalgiques comme l'ibuprofène, le paracétamol et les opioïdes **ne soulagent pas** l'AVF. L'oxygène à haut débit, les triptans injectables et certains psychédéliques peuvent stopper les crises.

Vous pensez en souffrir ?

Faites le test gratuit de 2 minutes.



Découvrez les traitements efficaces

ClusterInfo.org propose des guides clairs et fondés sur les preuves pour les patients, leurs proches et les soignants.

