


O que é a cefaleia em salvas?

A cefaleia em salvas (também conhecida como “cefaleia suicida”) é muitas vezes descrita como a pior dor que uma pessoa pode sentir. Ela é diferente da enxaqueca e precisa de um tratamento diferente.



👁 Dor extrema de um lado só, atrás do olho

Perfurante, muitas vezes comparada a um ferro em brasa no olho.

🕒 Ataques de 15 minutos a 3 horas

Muitas vezes várias vezes ao dia (em horários parecidos), por semanas ou meses (ciclos).

💧 Olho vermelho ou lacrimejando, nariz escorrendo ou entupido

Geralmente só no lado da dor.

👣 Inquietação ou agitação

Andar de um lado para o outro ou balançar o corpo, sem conseguir ficar parado.



Não é enxaqueca

	CEFALEIA EM SALVAS	ENXAQUECA
Duração	15 min a 3 horas	4 a 72 horas
Frequência	Na maioria dos dias, muitas vezes vários por dia, por semanas ou meses	Uns poucos por mês
Durante um ataque	Agitação, andar de um lado para o outro	Deitado, imóvel, em um quarto escuro



Como tratar a cefaleia em salvas

Analgésicos como ibuprofeno, paracetamol e opioides **não ajudam** na cefaleia em salvas. Oxigênio em alto fluxo, triptanos injetáveis e alguns psicodélicos podem interromper os ataques.

Você acha que pode ter?

Faça o teste gratuito de 2 minutos.



Conheça os tratamentos eficazes

O ClusterInfo.org tem guias claros e baseados em evidências para pacientes, cuidadores e profissionais de saúde.

